

Activités numériques

(12 points)

Exercice 1

On considère la fraction $\frac{170}{578}$.

- 1) Montrer que cette fraction n'est pas irréductible.
- 2) Déterminer le PGCD des nombres 170 et 578 (faire apparaître les différentes étapes).

- 3) Écrire la fraction $\frac{170}{578}$ sous forme irréductible.

Exercice 2

Soit $C = (x - 1)(2x + 3) + (x - 1)^2$

- 1) Développer l'expression C et montrer qu'elle est égale à $3x^2 - x - 2$.
- 2) Calculer la valeur de C pour $x = \sqrt{2}$ et la mettre sous la forme $a - \sqrt{2}$ où a est un nombre entier.
- 3) Factoriser l'expression C .
- 4) Résoudre l'équation :

$$(x - 1)(3x + 2) = 0$$

Exercice 3

- 1) Résoudre le système suivant


$$\begin{cases} 2x + 3y = 30 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

- 2) Le CDI d'un collège a acheté 2 exemplaires d'une même bande dessinée et 3 exemplaires d'un même livre de poche pour la somme de 30 euros. Une bande dessinée coûte 5 euros de plus qu'un livre de poche. Quel est le prix d'une bande dessinée? Quel est le prix d'un livre de poche?

Activités géométriques

(12 points)

Exercice 1



Un cône de révolution a pour sommet le point S . Sa base est un disque de centre O et de rayon 4 cm. Sa hauteur $[SO]$ est telle que $SO = 2,8$ cm.

- a) Déterminer l'arrondi au degré de l'angle \widehat{OSB} .
- b) Déterminer le volume de ce cône et donner son arrondi au cm^3 .

Exercice 2

On considère la figure ci-contre.
 Cette figure n'est pas en vraie grandeur et n'est pas à reproduire.

Elle est fournie pour préciser la position des points. L'unité est le centimètre.

1) Le triangle ABC est rectangle en A. $AB = 5$, $BC = 13$


Démontrer que $AC = 12$.

2) Les points A, C, M sont alignés. Les points B, C, N sont alignés. $CM = 2,4$ et $CN = 2,6$.

Démontrer que les droites (AB) et (MN) sont parallèles.

3) Calculer la longueur MN.

4) Préciser la nature du triangle CMN ; justifier la réponse sans effectuer de calcul.



Exercice 3

On considère l'hexagone régulier ABCDEF ci-contre de centre O (l'hexagone n'est pas à reproduire).


On demande de déterminer l'image du triangle BCO par :

1) la translation de vecteur \overrightarrow{AF} ;

2) la symétrie d'axe (BE) ;

3) la rotation de centre O et d'angle 60° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pour répondre, on complètera les trois phrases figurant dans l'annexe .



Problème

(12 points)

Les parties A, B et C sont indépendantes.

En octobre 2001, un groupe de 15 amis a participé à un semi-marathon (une course à pied de 21 km).

Le diagramme en bâtons ci-dessous précise les résultats du groupe. Il indique par exemple que 4 de ces amis ont couru ce semi-marathon en 105 minutes.


PARTIE A

1) Compléter le tableau de l'annexe.

2) On a défini ci-dessus la série statistique donnant la durée de la course des coureurs.

À l'aide du diagramme en bâtons ou du tableau complété en annexe :

- a) Calculer son étendue.
- b) Déterminer sa médiane.
- c) Calculer sa moyenne.

**PARTIE B**

Fabien, l'un des participants, a parcouru les 21 km à la vitesse constante de 12 km par heure.

- 1) Déterminer en minutes la durée de la course de Fabien.
- 2) On s'intéresse à la distance en km séparant Fabien de la ligne d'arrivée après x minutes de course ($0 \leq x \leq 105$).

On note $f(x)$ cette distance et on admet que $f(x) = 21 - 0,2x$.

Ainsi $f(10) = 19$ indique qu'après 10 minutes de course Fabien est à 19 km de la ligne d'arrivée.

Dans le repère orthogonal de l'annexe, tracer la représentation graphique de la fonction affine f définie par $f(x) = 21 - 0,2x$.

- 3) Par lecture graphique (laisser visible les tracés utiles), déterminer :
 - a) La distance en kilomètres séparant Fabien de l'arrivée après 30 minutes de course.
 - b) La durée en minutes écoulée depuis le départ lorsque Fabien est à 7 km de l'arrivée.
- 4) a) Résoudre l'équation : $21 - 0,2x = 17$.
 b) Que représente pour le problème la solution de cette équation?

PARTIE C

On suppose dans cette partie que :

Les 9 premiers kilomètres sont en montée, les 12 autres sont en descente.

Laurent a parcouru :

les 9 premiers kilomètres en 40 minutes, Les 12 derniers kilomètres en 50 minutes.

- 1) Calculer en km par heure la vitesse moyenne de Laurent en montée.
- 2) Calculer en km par heure la vitesse moyenne de Laurent en descente.
- 3) Calculer en km par heure la vitesse moyenne de Laurent sur le parcours total.

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES - EXERCICE 3

- 1) L'image du triangle BCO par la translation de vecteur \overrightarrow{AF} est
- 2) L'image du triangle BCO par la symétrie d'axe (BE) est
- 3) L'image du triangle BCO par la rotation de centre O et d'angle 60° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre est

PROBLÈME - PARTIE A - 1.

Durée en minutes	90	100	105	120
Effectifs (nombre de coureurs)			4	

PROBLÈME - PARTIE B - 2) et 3)

